

La Psoriasi e la SAT-Terapia



Dott.ssa Rita Brandi

Medico Chirurgo

Senologia, Ecografie.

Prevenzione e Bioterapia Oncologica.

Terapia Disintossicante Infusionale.

SAT-Terapia.

La Psoriasi

La psoriasi è una malattia diffusa: circa 110 milioni di persone affette nel mondo.

In Italia vi sono circa 3 milioni di malati e la loro incidenza è maggiore in alcune regioni come il Lazio, dove risultano decine di migliaia di malati di psoriasi.

LA PSORIASI IN ITALIA

REGIONE	%	Persone affette da psoriasi
Abruzzo,Lazio,Molise	4.5	254 956
Emilia-Romagna	4.0	139 408
Campania	3.7	168 386
Marche, Toscana,Umbria	3.4	170 559
Friuli V.G.,Trentino A.A.,Veneto	2.8	156 709
Sicilia	2.6	99 154
Lombardia	2.4	187 140
Valle d'Aosta, Liguria,Piemonte	2.3	115 154
Puglia, Basilicata, Calabria	1.6	87 132
Sardegna	0.8	11 517
In Italia	2.9	1 390 119

La Psoriasi

La psoriasi è una malattia diffusa dermatologica caratterizzata da manifestazioni cliniche eterogenee localizzate a piccole aree, oppure sull'intera superficie corporea.

La psoriasi, nel 50-60% dei casi, si accompagna al prurito, con la conseguenza che il paziente si autoinduce frequentemente delle lesioni in seguito all'effetto traumatico del grattamento.

Una complicanza particolarmente grave della psoriasi è il coinvolgimento articolare (mono o poli) che si stima intorno al 30% dei pazienti.

Se vi è un coinvolgimento UNGUEALE, generalmente si associa un coinvolgimento ARTICOLARE.

La diagnosi e la terapia precoce dell'interessamento psorisiaco articolare è fondamentale per arrestare e prevenire i progressivi processi di deformazione.

La psoriasi è una malattia ad andamento cronico, con tendenza alla recidiva.

I picchi di insorgenza sono intorno ai 20-25 anni e tra i 50-60 anni. Se insorge in età giovanile è caratterizzata da un decorso più severo. Anche in età pediatrica può insorgere la psoriasi.

La psoriasi ha molti meccanismi di sviluppo immunologico in comune con altre patologie autoimmuni come il morbo di Chron e l'artrite reumatoide; si accompagna spesso ad altre comorbilità come l'ipertensione, il diabete e l'artropatia in generale, (psoriasi, artrite psoriasica e artrite reumatoide, spondiloartriti in generale e morbo di Crohn).

La Psoriasi: Terapie tradizionali

- Lozioni (localizzazioni al cuoio capelluto);
- Terapie topiche a base di Vitamina D₃ e corticosteroidi a basse concentrazioni
- Se le aree cutanee sono estese (valutate da 0 a 72 PASI Psoriasis area severity index, 72 indica l'intera superficie corporea) con PASI superiori a 10, il trattamento diviene sistemico con CICLOSPRINA A per l'interessamento cutaneo; con METHOTREXATE quando vi è interessamento articolare.

In associazione si usa fototerapia con raggi ultravioletti UVB a banda stretta e PUVA () fotochemioterapia a raggi ultravioletti A (UVA) + psoraleni).

Se il paziente non può assumere ciclosporina o methotrexate e fotochemioterapia PUVA per gravi controindicazioni, o non risponde ai 2 farmaci viene trattato con anticorpi monoclonali, che inibiscono il TNF- α (antagonisti del TNF- α tessutale).

COSTO DELLE TERAPIE TRADIZIONALI

ASSOCIAZIONE FARMACI	COSTO ANNUO (€)
INFLIXIMAB, ADALIMUMAB, ETENERCEPT	12.000/14.000
Ciclosporina anche a dosi importanti	4.000/6.000

La Psoriasi: IL CASO

Paziente maschio anni 34 avambraccio destro



Inizio Terapia



SAT Terapia dopo 60 gg.

La Psoriasi: IL CASO

Paziente maschio anni 34 gomito destro



Inizio Terapia



SAT Terapia dopo 60 gg.

La Psoriasi: IL CASO

Paziente maschio anni 34 mano sinistra



Inizio Terapia



SAT Terapia dopo 60 gg.

La Psoriasi: IL CASO

Paziente maschio anni 34 gamba sinistra



SAT Terapia dopo 30 gg.



SAT Terapia dopo 90 gg.

La Psoriasi e la SAT-Terapia

Diluiti Serolab Prodest in supposte.

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

riposo
riposo

Terapie domiciliari con
preparati SAT somministrati
in funzione del caso clinico

Ciclo di terapia per 3 settimane più 1 di riposo, per 6 mesi minimo!

Terapia aggiuntiva: ID

Fiale

In cocktail perilesionale

in 22 VC

sul fondo della fossetta soprasternale

in 17 VC punta intramammellare (4^o spazio intercostale)

in 11 VG tra apofisi spinosa D5-D6